

Tasa de mortalidad por tumores en hombres

Nombre del Indicador:

Tasa de mortalidad por tumores en hombres

Código:

5102170

Tema:

Salud y Protección Social

Subtema:

Mortalidad

Definición y forma de cálculo:

Cociente del número de defunciones de hombres por tumores entre la población de hombres residente en la ciudad calculada a 1 de julio del año de referencia

Fuentes de la Información:

Registro de mortalidad del Servicio de Epidemiología. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Padrón Municipal de Habitantes. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València.

Periodicidad de Actualización:

Anual

Unidades de medida:

Expresado en tanto por 100.000.

Observaciones e Interpretación:

Se ha utilizado la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión (CIE-10). La causa de muerte es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeran directamente la muerte. Cuando la causa es una lesión traumática, se considera causa básica las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Se incluyen todas las defunciones clasificadas según la CIE-10 en los códigos C00-C14, C15-C26, C30-C39, C40-C41, C43-C44, C45-C49, C50, C51-C58, C60-C63, C64-C68, C69-C72, C73-C75, C76-C80, C81-C96, C97, D00-D09, D10-D36, D37-D48. La población a mitad del año de referencia se obtiene de la explotación estadística del fichero del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de València, y se calcula como semisuma de las poblaciones correspondientes a 1 de enero del año de referencia y 1 de enero del año siguiente.
